

御製詩經卷之十四

上

七

御纂醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣目錄

發無定處下

疥瘡

癬

黃水瘡

暑令瘍毒小瘡

瘡疽

產後癰疽

翻花瘡

無圖

血風瘡

瘡瘍

浸淫瘡

火赤瘡

貓眼瘡

魚脊瘡

骨痠瘡

風疔 無圖

血疔

白疔

漆瘡

血箭

血痣

股痛 無圖

瘡口誤入毒水 無圖

諸瘡生蠅蛆 無圖

瘡木

瘡合

瘡

瘡

瘡

瘡

瘡

醫宗金鑑卷七十四

編輯外科心法要訣

疥瘡圖

疥瘡五種



疥瘡

疥瘡乾濕蟲砂膿各經蘊毒風化成治論上下分肥瘦清風利濕兼殺蟲

註

此證有乾濕蟲砂膿之分其形雖有五種總由各經蘊毒日久生火兼受風濕化生斯疾或傳染而生凡疥先從手了生起遶遍週身癢癢無度如肺經燥盛則生乾疥癢癢皮枯而起白屑如脾經濕盛則生濕疥聾腫作痛破津黃水甚流黑汁如肝經風盛則生蟲疥癢癢徹骨撓不知疼如心血凝滯則生砂疥形如細砂焮赤癢痛抓之有水如腎經濕熱則生膿窠疥形如豆粒便利作癢膿清淡白或

脾經濕盛亦生膿窠疥但頂含稠膿癢疼相兼爲異疥雖有餘之證而體虛之人亦生以便秘爲實便利爲虛亦有虛而便燥者如風秘則便燥血分枯燥則便澁又在瘡形色重色淡及脈息之有力無力辨之初起有餘之人俱宜防風通聖散服之虛者服荆防敗毒散透發之及形勢已定則無論虛實乾疥服消風散濕疥服蒼朮膏蟲疥服蘆薈丸砂疥服犀角飲子膿窠疥服秦艽丸經久不愈血燥者服當歸飲子外治乾疥者擦繡毬丸濕者擦臭靈丹潤燥殺蟲俱效疥生上體多者偏風熱盛下體多者偏風濕盛肥人多風濕瘦人多血熱詳辨治之

蒼朮膏

南蒼朮

十觔切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以朮無味為度併汁一處用小砂鍋再煎如乾一寸加汁一寸煎成膏加蜂蜜四兩和勻

每服二羹匙空心白滾水調服

方歌蒼朮膏醫濕疥瘡切片入鍋煮取湯熬膏加蜜空心服濕

除熱散勝羣方

犀角飲子

犀角

鎊

赤芍

甘花菊

元參

木通

赤小豆

炒

石菖蒲

各一錢五分

甘草

生一錢

生薑三片水二鍾煎八分服

方歌犀角飲子砂疥生癢疼色赤出心經芍菊元參通赤豆莢

蒲薑草水煎成

秦艽丸

秦艽

苦參

大黃

酒蒸

黃耆

各二兩

防風

漏蘆

黃連

各一兩五錢

烏蛇肉

五錢

酒浸焙乾

共為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食後溫酒

送下

方歌秦艽丸服膿疥愈清熱癢除瘡自去苦參大黃風漏蘆烏

蛇黃連者蜜聚

當歸飲子

當歸

生地

白芍

酒炒

川芎

何首烏

荆芥

防風

白蒺藜

各一錢

黃耆

甘草

生各五分

水二鍾煎八分食遠服

方歌當歸飲子膿疥久癢漆血燥不能除四物黃耆何首草荆

防痰入風自疎

繡毳丸

川椒

輕粉

樟腦

雄黃

枯白礬

水銀 各二錢

大風子肉

一百枚
另研

共研細末同大風子肉再碾勻加柏油一兩化開和藥攪

勻作丸以二掌合搓如圓眼大先以鼻聞次擦患處

方歌

雄黃礬水銀大風子研柏油兌乾

疥搥擦效如神

臭靈丹

硫黃末

油核桃

生豬脂油 各一兩

水銀 一錢

搗膏用擦患處

方吳靈丹擦膿濕疥硫黃末共油核桃生豬脂油各一兩水

銀一錢同搗膏

防風通聖散

見頭部

荆防敗毒散

見頭部

消風散

見頭部

盧齋丸

見牙齒部

癰 瘡 圖

癰瘡六種



癬

癬證情形有六般風熱濕蟲是根原乾濕風牛松刀癬春生桃花面上旋

註

此證總由風熱濕邪侵襲皮膚鬱久風盛則化爲蟲是以搔癢之無休也其名有六一曰乾癬搔癢則起白屑索然彫枯二曰濕癬搔癢則出黏汁侵淫如蟲行三曰風癬卽年久不愈之頑癬也搔則痺頑不知痛癢四曰牛皮癬狀如牛領之皮厚而且堅五曰松皮癬狀如蒼松之皮紅白斑點相連時時作癢六曰刀癬輪郭全無縱橫不定總以殺蟲滲濕消毒之藥敷之輕者羊蹄根散久頑者必效散

搽之亦有脾肺風濕過盛而腫痛者宜服散風苦參丸解
散風濕其腫痛卽消又有面上風癬初如瘡疥或漸成細
瘡時作痛癢發於春月又名吹花癬卽俗所謂桃花癬也
婦女多有之此由肺胃風熱隨陽氣上升而成宜服疎風
清熱飲外用消風玉容散每日洗之自效

羊蹄根散

羊蹄根 八錢

枯白礬 二錢

共研勻米醋調擦癬處

方歌

羊蹄根散敷諸癬羊蹄根共枯白礬二味研末加米醋搽
患溲濕癢可痊

必效散

川槿皮 四兩

海桐皮

大黃 各二兩

百藥煎 一兩四錢

巴豆 一錢五分

盤螯 一個

雄黃

輕粉 各四錢

共研極細末用陰陽水調藥將癰極損薄敷藥乾必待白

落

方歌

必效大黃百藥煎川槿海桐巴豆盤雄黃輕粉陰陽水調

搽諸癰久年頑

散風苦參丸

苦參 四兩

大黃

炒香

獨活

防風

枳殼

麤炒

元參

黃連

各二兩

黃芩

梔子

生

菊花

各一兩

共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十九食後白滾

水送下日用三服茶酒任下

方歌散風苦參風濕盛癰瘡多癢腫痛兼大黃芩獨防風枳元

參梔子菊黃連

疎風清熱飲

苦參

二錢酒浸蒸曬九次炒黃

全蠍

土炒

皂刺

豬牙皂角

防風

荆芥穗

不食鹽金銀花各一錢

金銀花

蟬蛻

炒各一錢

酒水各一鍾加葱白三寸煎一鍾去渣熱服忌發物

方歌疎風清熱風癱患時作痛癢極纏綿苦參蠟刺猪牙皂防

風荆芥銀花蟬

消風玉容散

綠豆麪三兩

白菊花

白附子

白芷各一兩

熬白食鹽五錢

共研細末加冰片五分再研勻收貯每日洗面以代肥皂

方歌消風玉容綠豆麪菊花白附芷食鹽研加冰片代肥皂風

除癬夫昆為尤

黃水瘡圖



黃水瘡

黃水瘡

黃水瘡如粟米形起時作癢破時疼外因風邪內濕熱黃水浸淫更復生

註

此證初如粟米而癢兼痛破流黃水浸淫成片隨處可生由脾胃濕熱外受風邪相搏而成宜服升麻消毒飲熱甚外用青蛤散敷之濕盛碧玉散敷之卽效痂厚用香油潤之忌見水洗

升麻消毒飲

當歸尾

赤芍

金銀花

連翹

去心

牛蒡子

炒

梔子

生

羌活

白芷

紅花

防風

甘草

生

升麻

桔梗

每味用二錢為大劑一錢五分為中劑一錢為小劑水三
鍾煎八分食遠熱服

如瘡生頭面減去歸尾紅花

方歌

升麻消毒却風濕歸芍銀花翹
夢梔羌芷紅花防草桔黃

水浸淫服漸失

青蛤散

見鼻部
鼻蠶瘡

碧玉散

見面部
燕窩瘡

暑令瘍毒小瘡圖



暑令瘍毒小瘡

暑令瘍毒小癰

暑令瘍癰焮腫疼頭暈口苦背肌紅較之癰疽發熱異不分日夜似火攻

註

此證係暑令所生瘍毒小癰初發背心肌膚紅暈次生腫

痛發熱無時日夜不止兼頭目暈眩口苦舌乾心煩背熱

肢體怠倦初宜荆防敗毒散加藿香黃連石膏服之外治

按癰疽腫瘍潰瘍門

荆防敗毒散

見頭部
腦疽

圖

疽

庫



瘡疽生在筋骨先黑變青色如拳打之狀

瘡疽

瘡疽因受山嵐瘴氣伏藏久痛附筋骨初黑次青如拳打急破惡

血後膿熟

註

此證因受山嵐瘴氣伏藏筋骨之間年月久遠令人痛附

筋骨始發黑色頑痺如木石其毒附着於筋骨重按方知

微痛五七日後毒勢湧出浮腫次變青色如拳打之狀寒

戰似瘧頭顱口偏手足厥逆黑睛緊小始見黑色時急用

砭法令出惡血隨服不換金正氣散加羚羊角以洩邪毒

次按癰疽腫瘍潰瘍治法膿熟潰黃白膿爲順出黑汁者

險

不換金正氣散

蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑製

陳皮

藿香

半夏

炒

各二錢

甘草

炙

一錢

水二鍾生薑五片紅棗肉二枚煎一鍾去渣稍熱服忌生

冷油膩

方歌

正氣散因山瘴感伏久生疽身戰寒平胃散加半夏藿

香薑棗服平安

產後癰疽圖



產後癰疽

產後癰疽最屬險七情之傷六淫感瘀血稽留成癰疽勢潰托裏不宜緩

註

此證因產後氣血經絡俱虛或因七情所傷或因六淫所感與瘀血相稽而成最屬險候法宜大補扶助根本兼活瘀生新為要其客病以末治之初服生化湯隨證加減以消毒有衣邪服清魂散有裏熱服回生丹勢欲潰膿時急宜托裏遲則恐毒內陷藥味宜和平純善最忌汗下峻劑其餘腫潰治法俱按癰疽腫瘍潰瘍門

生化湯

當歸 八錢

川芎 四錢

薑炭

甘草 各四分

桃仁 十枚 去皮尖研泥

水一鍾半煎六分加無灰酒一小杯和服

方歌 生化湯宜產後直通滯和榮又補虛歸芎薑炭炙甘草桃

仁酒服善消瘀

清魂散

荊芥 一錢

川芎 五分

人參

甘草

澤蘭葉 各三分

為末黃酒調服

方歌 清魂產後風邪侵荊芥川芎與人參炙甘澤蘭同作劑能

疎表證效通神

回生丹

黑豆

三升煮熟取汁三盞去豆

紅花

三兩炒黃色入醇酒大盞同煮三五滾去紅花用汁

生大黃

一觔研末

蘇木

二兩判用河水五盞煎汁三盞去渣

先將大黃末以好米醋三四盞攪勻文武火熬成膏如此

二遍次下紅花酒蘇木湯黑豆汁共熬成膏離火再入後藥

當歸

熟地

川芎

白茯苓

延胡索

烏藥

香附

蒲黃

半膝

桃仁

另研

茯苓

各二兩米泔水浸炒

白芍

酒炒

甘草
炙

羌活

山茱肉
酒浸

三棱

陳皮

地榆

木香

五靈脂
各五錢

人參

白朮

土炒

青皮

木瓜
各三錢

良薑

四錢

乳香

沒藥
各一錢

共研細末用大黃膏為丸如彈子大每服一丸黃酒炖化

通口服

方歌回生產後存惡露致發癰疽服可逐除熱活瘀榮衛和紅

花大黃豆蘇木八珍羌莖稜延胡烏藥青陳榆香附乳沒

蒲黃良膠瓜木香靈脂桃蒼木

翻花瘡 無圖

翻花瘡因潰後生頭大蒂小努菌形雖無痛癢觸流血血燥肝虛怒氣成


註此證因生瘡潰後努肉自瘡口突出其狀如菌頭大蒂小

愈努愈翻雖不大痛大癢誤有觸損流血不佳久則虧虛總由肝虛怒氣血燥而成宜服逍遙散外用烏梅煨灰輕粉各等分研末撒之或馬齒莧煨灰豬脂調敷俱效

逍遙散 見背部上搭手

血 風 瘡 圖

血風瘡發在遍身起如粟米下視淡紅暈



血風瘡

血風瘡證生徧身粟形搔癢脂水淫肝肺脾經風濕熱久鬱燥癢抓血津

註

此證由肝脾二經濕熱外受風邪襲於皮膚鬱於肺經致徧身生瘡形如粟米搔癢無度抓破時津脂水浸淫成片令人煩躁口渴搔癢日輕夜甚宜服消風散外敷雄黃解毒散若日久風邪鬱在肌膚則耗血生火搔癢倍增夜不得寐撓破津血心煩大便秘咽乾不渴此屬火燥血短宜服地黃飲外擦黃連膏潤肌膚合而用之悉效兼忌椒

酒雞鴨

等物

雄黃解毒散

雄黃

寒水石

各一兩

白礬

四兩

共研細末滾水調敷

方歌雄黃解毒寒水石白礬四兩共研之血風瘡生粟米瘡滾

水調敷滲毒濕

地黃飲

生地

熟地

何首烏

各三錢

當歸

二錢

丹皮

黑參

白蒺藜

炒去刺

殭蠶

各一錢五分

紅花

甘草

各五分

水煎早晚服

方歌地黄飲治血風瘡癢盛不眠血燥傷首烏丹皮生熟地

參歸疾草紅殭

消風散

見項部
錫扣風

黃連膏

見鼻部
鼻給

潤肌膏

見項部
白屑風

瘡 痛 圖

瘡痛形如豆瓣痛死瘡紅腫者是



瘡痛

瘡瘡汗出中邪風狀類豆辦扁瘡形日癢秦朮湯宜服夜重當歸飲服寧

註此證俗名鬼飯疔瘡由汗出受風或露臥乘涼風邪多中

表虛之人初起皮膚作癢次發扁疔瘡形如豆辦堆疊成片日癢甚者宜服秦朮牛蒡湯夜癢重者宜當歸飲子服之外用燒酒浸百部以藍布蘸酒擦之謹避風涼自效

秦朮牛蒡湯

秦朮 一錢五分

牛蒡子 炒研

枳殼 麩炒

麻黃 蜜炙

黃芩

防風

甘草
生

黑參

升麻
各一錢

水二鍾煎八分服

方歌秦艽牛蒡風留膚痞瘡生如麻豆形枳殼麻黃犀角鎊黃

芩風草黑參升

當歸飲子

見疥瘡

浸

淫

瘡

圖

浸淫瘡初起如細疥抓破津黃水蔓延成片



浸淫瘡

浸淫瘡發火濕風黃水浸淫似疥形蔓延成片瘡不止治宜清熱並消風

註

此證初生如疥搔癢無時蔓延不止抓津黃水浸淫成片

由心火脾濕受風而成經云歲火太過甚則身熱肌膚浸

淫仲景云從口流向四肢者順四肢流入口者逆初服升

麻消毒飲加蒼朮川黃連抓破津血者宜服消風散外搽

青蛤散即愈若脈遲不食黃水不止此屬脾敗不治之證也

升麻消毒飲

見黃水瘡

消風散

見項部鈕扣風

青蛤散

見鼻部鼻鼻瘡

火 赤 瘡 圖

火赤瘡起癰膿紫腫



天腫瘡頂白根赤癰膿水腫

火赤瘡

火赤瘡由時氣生燎漿水皰遍身成治分上下風濕熱瀉心清脾自可寧

註此證由心火妄動或感酷暑時臨火邪入肺伏結而成初

起小如芡實大如棋子燎漿水皰色赤者爲火赤瘡若頂白根赤名天泡瘡俱延及遍身燉熱疼痛未破不堅皰破毒水津爛不臭上體多生者屬風熱盛宜服解毒瀉心湯下體多生者屬濕熱盛宜服清脾除濕飲未破者俱宜蟬蚪拔毒散敷之已破者俱宜石珍散撒之清其濕熱破爛自乾甚效

解毒瀉心湯

黃芩

黃連

牛蒡子

炒研

知母

石膏

煨

梔子

生

防風

元參

荊芥

滑石

各一錢

木通

甘草

各五分生

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌解毒瀉心湯火赤芩連牛蒡木通知石膏梔子防風草元

參荆芥與滑石

清脾除濕飲

赤茯苓

白朮

二炒

蒼朮

米泔浸炒

黃芩

生地黃

麥冬

去心

梔子

生研

澤瀉

甘草

生

連翹

去心

茵陳蒿

枳殼

麩炒

元明粉

各一錢

水二鍾竹葉二十片燈心二十根煎八分食前服

方歌

清脾除濕天炮疾赤苓二朮芩生地麥冬梔瀉草連翹茵

陳元明同作劑

石珍散

輕粉

石膏

各一兩
煨

黃蘗末

青黛

各三錢

共研勻先以甘草湯洗淨瘡處再用此藥敷之

方歌石珍散去火邪害天炮破撒自康泰一兩輕粉煨石膏三

錢黃藥加青黛

蚪蚪拔毒散

見腫瘍門

貓眼瘡圖

貓眼瘡形如貓眼光彩閃爍



貓眼瘡

貓眼瘡名取象形痛癢不常無血膿光芒閃爍如貓眼脾經濕熱外寒凝

註此證一名寒瘡每生於面及遍身由脾經久鬱濕熱復被

外寒凝結而成初起形如貓眼光彩閃爍無膿無血但痛癢不常久則近脛宜服清肌滲濕湯外敷真君妙貼散兼多食雞魚蒜韭忌食鮎魚鱗鰕而愈

清肌滲濕湯

蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑汁炒

陳皮

甘草

生

柴胡

木通

澤瀉

白芷

升麻

白朮

土炒

梔子

生

黃連

各一錢

水二鍾生薑三片燈心二十根煎至八分溫服

方歌

清肌滲濕瘡貓眼脾濕熱鬱外寒纏平胃柴胡通瀉芷升

麻白朮梔黃連

真君妙貼散

見腫瘍門

魚脊瘡圖



魚脊瘡初起曰胞漸長如魚脊狀

魚脊瘡

魚脊瘡由虛人成感受濕熱皮間凝虛寒發緩炮津水炙變稠
膿陽氣生

註

此證形如魚脊由陽氣虛寒之人復感濕熱結滯而成多
生筋骨之間以陽氣虛寒故發長緩慢只在皮膚堅凝聳
痛初起白炮漸長狀如魚脊破津黃水正膿生遲初治無
論已破未破宜蒜片艾灸以通陽氣外用真君妙貼散香
油調敷宜服內補十宣散得稠膿色鮮者為順若灸之不
應色暗腐爛出臭水者逆其次內外治法俱按癰疽潰瘍

真君妙貼散

見腫瘍門

內補十宣散

見胸部癰疽

骨 痠 瘡 圖



骨瘡瘡色紅如火

骨痠瘡

骨痠瘡形粟豆紅漸如梅李火毒成膿血不出痛不止治同疔法卽成功

註

此證初生形如粟豆色紅漸大如梅如李山火毒而成血不出膿不生痛亦不止久則延及遍身內外治法與疔門

參考

風疔

無圖

風疔證如風癰形破流黃水癢微疼由於風濕客谷道如聖膏搽功卽成

註此證由風濕客於谷道而成形如風癰作癢破流黃水浸
濡偏體微疼宜用如聖膏搽之即愈

如聖膏

當歸 五錢

巴豆 三錢
去殼

香油八兩將二藥燥枯去渣入黃臘三兩化盡離火絹濾
淨將凝入輕粉二錢攪勻搽之

方歌如聖膏用歸巴豆二錢一同入香油燥枯加蠟添輕粉凝
搽風疔功即收

圖

疔

血



血疔發在遍身形如紫赤其色紅紫瘡



血疔

血疔形如紫疥瘡痛癢時作血多傷證因風熱閉腠理消風散服功最速

註此證由風熱閉塞腠理而成形如紫疥痛癢時作血燥多

熱宜服消風散

消風散

見頭部
鉗扣風

白 疔 瘡 圖

白疔生在身色白瘡瘻起白皮



白疔

白疔之形如疹疥色白而癢多不快固由風邪客皮膚亦由血

燥難榮外

註

此證俗名蛇風生于皮膚形如疹疥色白而癢搔起白皮

由風邪客于皮膚血燥不能榮養所致初服防風通聖散
次服搜風順氣丸以豬脂苦杏仁等分共搗絹包擦之俱

效

搜風順氣丸

大黃

五兩 酒浸 蒸曬九次

車前子

酒炒

山萸肉

山藥

炒

牛膝

酒浸

菟絲子

酒煮

獨活

火麻仁

微火焙去殼

檳榔

枳殼

楚炒

郁李仁

各二兩滾水浸去皮

羌活

一兩

右爲末煉蜜和丸如梧桐子每服三十九茶酒任下早晚

各一服

方歌搜風順氣車前子莫藥大黃膝菟絲羌獨火麻榔枳郁服

去風邪血燥滋

防風通聖散

見頭部

漆瘡圖



如

漆瘡

漆瘡感受漆毒生腠理不密腫焮紅初發覺癢後如疹皮破流水更兼疼

註

此證由人之腠理不密感漆辛熱之毒而生初發面癢而腫抓之漸似癰疹色紅偏傳肢體焮痛皮破爛斑流水甚者寒熱交作宜韭菜汁調三白散塗之內服化斑解毒湯忌浴熱水戒酒膩厚味發物或用神麴研爲末生蠟黃調塗患處尤效

三白散

鉛粉 一兩

輕粉 五錢

石膏 三錢

共研勻韭菜汁調敷紙蓋如無韭菜汁涼水調亦可

方歌 三白散敷漆瘡消輕粉鉛粉煨石膏去熱解毒功效速研

勻須用韭菜汁調

化斑解毒湯

見肋部內發丹毒

血 箭 圖

血箭發無定處血從毛孔射出



血箭

血箭毛孔射出血心火熾迫血亂行桃花散用涼水敷再塗金墨卽能停

註

此證一名肌衄由心肺火盛逼血從毛孔中射出如箭宜服涼血地黃湯外用桃花散以涼水調敷或用金墨研末醋調涼塗其血卽止

涼血地黃湯

生地 三錢

黃連

當歸 各一錢五分

甘草

梔子 生研

元參 各一錢

黃芩 二錢

水二鍾煎八分量病上下服之

方歌涼血地黃心火盛毛孔血溢不歸經黃連歸草苓梔子元
參煎服效通靈

桃花散

白石灰半升用水潑成末與大黃片一兩五錢同炒以灰變
紅色爲度去大黃將石灰篩細用涼水調敷

方歌桃花止血最爲良一兩五錢生大黃半升石灰相併炒去
軍研篩水調強

血 疰 圖



血疰

血瘰

血瘰初起似瘰形漸大如豆其色紅指破外皮流鮮血肝經怒火鬱血成

註

此證由肝經怒火鬱血而成初起如瘰色紅漸大如豆觸破時流鮮血用花蒞石散撒之血已止宜冰蠟散枯去本瘰以月白珍珠散用太乙膏蓋貼生皮卽愈血出甚者服涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蒞石散

花蒞石

五錢火煨入童便淬之七次

草烏

南星

白芷

厚朴

紫蘓

羌活

沒藥

輕粉

龍骨

煨

細辛

檀香

蘇木

乳香

蛇含石

火煨童便浸三次

當歸

降真香

各二錢

麝香 三分

共為細末罐收臨用時撒於患處

方歌

花蕊石散止血強草烏星芷厚蘇羌沒輕龍骨細檀麝蘇

木乳歸含降香

冰蠟散

即水蠟熬研末見乳部乳岩

月白珍珠散

見潰瘍門

涼血地黃湯

見血箭

太乙膏

見潰瘍門

血瘰

血瘰初起似瘰形漸大如豆其色紅指破外皮流鮮血肝經怒火鬱血成

註

此證由肝經怒火鬱血而成初起如瘰色紅漸大如豆觸破時流鮮血用花蘆石散撒之血已止宜冰蠟散枯去本瘰以月白珍珠散用太乙膏蓋貼生皮即愈血出甚者服涼血地黃湯兼戒厚味發物

花蘆石散

花蘆石

五錢火煨入童便淬之七次

草烏

南星

白芷

厚朴

紫蘓

羌活

沒藥

輕粉

龍骨

煨

細辛

檀香

蘇木

乳香

蛇含石

火煨童便淬三次

當歸

降真香

各二錢

麝香

三分

共為細末罐收臨用時撒於患處

方歌

花蕊石散止血強草烏星芷厚蘇羌沒輕龍骨細檀麝蘇

木乳歸含降香

水蛭散

即水蛭熬研末見乳部乳岩

月白珍珠散

見潰瘍門

涼血地黃湯

見血箭

太乙膏

見潰瘍門

腹痛 無圖

腹痛本於寒氣侵鬱在肌

臂痛連心衣觸手捺無皮狀法宜椒

酒綿濕溫

註

此證係暴寒侵襲肌

骨之中寒鬱不行偶犯衣觸或以手

捺疼痛連心似乎如

小皮之狀法宜胡椒四錢燒酒四兩

共入磁盆內重湯炖

以軟綿蘸酒溫湯熨痛處即效

瘡口誤入毒水

無圖

瘡潰誤入污水毒或傷諸

利痛至骨金蟬散煨敷瘡內毒水流

盡刺亦出

註

瘡潰誤入皂角驢馬

尿糞一切污穢毒水入瘡或木刺傷

着於瘡內焮腫疼痛至骨者先以溫水洗瘡拭乾再用金蟬散煨煉妥協撒於瘡內外以加味太乙膏蓋之良久毒水流盡有刺亦自出矣

金蟬散

大乾蝦蟆一箇

胡椒十五粒

皂角子七粒

右用乾鍋入藥在內瓦蓋鍋口慢火煨至烟盡取出存性研爲細末取用

方歌

金蟬潰瘡受毒水腫焮成因木刺傷蝦蟆胡椒皂角子火

煨烟盡研撒

加味太乙膏

見

諸瘡生蠅蛆

無圖

夏月諸瘡臭腐爛蠅衆生蛆治勿慢蟬花散服可除之蛆化爲水蠅畏散

註

夏月諸瘡潰爛腐臭或孤單及懶惰之人失於洗浴積膿污穢蒼蠅聞穢叢聚以致生蛆宜急服蟬花散蛆盡化水而出蠅亦不敢近瘡要兒痘爛生疽者亦服前藥外用寒水石細末摻之又治瘡膿忽臭有冬月潰瘡生蛆者係陰濕之所化也宜海參爲末撒之或皂礬飛過爲末撒之其蛆亦化爲水

蟬花散

蛇蛻 一兩 火燒 蟬蛻

細辛 二錢五分

青黛 各五錢

右為末每服用三錢黃酒調服日用二服

方歌 蟬花散療諸瘡穢夏月生蛆蠅近圍蛇蛻細辛蟬蛻黛酒

調蛆化蠅畏飛

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣目錄

雜證部

跌撲

金瘡

箭頭入肉

鐵鍼入肉

鐵鍼誤入咽喉

誤吞銅錢

骨哽咽喉

杖瘡

夾傷

竹木刺入肉

破傷風

發瘰

湯火傷

凍瘡

人齧傷

熊虎狼傷人

馬齧傷

瘋犬齧傷

馬汗驢涎入瘡

蛇齧傷

蜈蚣齧傷

蠍螫

蠶齧

射工傷

蚯蚓傷

天蛇瘡

蠼螋傷

百蟲入耳

御纂醫宗金鑑卷七十五

編輯外科心法要訣

雜證部

跌撲

跌撲之證屬尋常復元活血湯最良已破亡血八珍服未破血瘀大成湯

註

此證有已破未破之分亡血瘀血之別如尋常跌撲微傷皮肉疼痛未破者以復元活血湯散瘀活血若損傷筋骨血流過多不止者卽爲亡血急用花蕊石散乾撒止血內服八珍湯加酒炙骨碎補續斷紅花若從高跌墜未曾損

破皮肉者必有瘀血流注臟腑人必昏沉不醒二便秘結
當以大成湯通利二便其人自醒若便利不醒者灌獨
湯救之

大成湯

大黃 三錢

枳殼

枳殼 各二錢
麩炒

厚朴 薑炒

當歸

紅花

木通

蘇木

陳皮

甘草 各一錢
生

水二鍾煎八分不拘時服服後二時不行渣再煎加蜜三

匙冲服

方歌大成活痰便立通消黃枳殼厚歸紅木通蘇木陳皮草煎

服不行加蜜冲

復元活血湯

當歸尾 二錢

柴胡 一錢五分

穿山甲 炙研

紅花

栝蒌仁 各七分

甘草 五分

桃仁 十七個

大黃 三錢

水二鍾酒二鍾煎一鍾食遠服以利為度

方歌復元活血跌撲證惡血流瘀積滯疼山甲柴紅栝蒌草桃

仁歸尾大黃行

花蕊石散

見發無定處血瘕

八珍湯

獨參湯 俱見潰瘍門

金瘡

金瘡須宜驗傷痕輕傷皮肉重傷筋外撒如聖桃花散血多八

珍湯獨參

註

此證有金刀傷箭簇傷磁鋒傷須看傷痕深淺輕者皮肉

破損血流不住以桃花散撒之重者筋斷血飛係大脈已

傷用如聖金刀散撒上以絹帛紮住止而復流再撒若藥

痂過厚拘痛者以生肌玉紅膏塗傷處外貼陀僧膏長筋

止痛生肌治之無論輕重傷破出血初服三黃寶蠟丸傷
破微出血者服黎洞丸若出血過多其人面黃眼黑不可
專攻瘀血宜用八珍湯甚者獨參湯先固根本二方俱加
蘇木紅花兼調瘀血此證雖係好肉暴傷然驗脈法形證
亦可以定生死如傷血過多脈見虛細沉小和緩者生若
脈見浮洪數大實虛促者死被傷入肺者二七死左脇下
傷內者腸全斷者少腹下傷內者傷處繁多者老人左股
歷碎者傷破陰子者肩內耳後傷透於內者死凡傷天臙
穴與眉角腦後臂裏跳脈髀內陰股兩乳上下心下鳩尾
及五臟六腑之輪者皆死腦後出髓而不能語目睛直視

喉中沸聲口急唾出兩手妄舉者亦死又有腹皮損破腸
出者看腸若僅傷一半者可治先以大麥煮粥取濃汁溫
洗其腸以桑皮尖片爲線蘸花藍石散縫腸傷口急於縫
處塗活雞冠血隨以清油塗腸令潤將腸輕輕納入腹中
外用生人長髮密縫腹傷口之裏肉留外皮撒月白珍珠
散以待生肌斂口若傷口大者不能外縫以陀僧膏護貼
候白潰膿卽按潰瘍門治法縫後勿驚笑以米飲少少飲
之漸增待二十日後再喫濃粥調理而愈

三黃寶蠟丸

藤黃

四兩製法見
黎洞丸內

天竹黃

無真者九轉
南星代之

紅芽大戟

劉寄奴

血竭各三兩

孩兒茶

雄黃各三兩

朴消一兩

當歸尾

一兩五錢

鉛粉

汞

即水銀

乳香

麝香各三錢

琥珀

二錢

各研極細末稱準和一處將水銀同鉛粉在鐵鍋內火上
熱研成末入前藥內共研勻用煉淨黃蠟二十四兩放磁
器內坐滾水中化開將藥入內攪勻病重者每丸一錢病
輕者每丸五分熱黃酒調服倘受傷至重連服數次服藥
後飲酒出汗更妙又治一切惡瘡以香油化開敷之甚效

方歌

三黃寶蠟號天竹大戟兒茶消寄奴雄竭藤黃鉛粉汞乳

和氣聖藥全錄 卷十一

歸麝碾去其粗蠟九黃酒熱調服外治惡瘡油化敷能療

金瘡傷損證續筋瘀散痛全無

黎洞丸

三七

生大黃

阿魏

孩兒茶

天竹黃

血竭

乳香

沒藥 各二兩

雄黃 一兩

山羊血

五錢無真者以小
子羊鮮心血代之

冰片

麝香

牛黃 各二錢五分
以上各研細末

藤黃

二兩以秋荷葉露泡之隔湯煮十餘次
去浮沉取中將山羊血拌入曬乾

取秋露水化藤黃拌藥搗千餘下如乾加煉蜜少許為丸

重一錢黃蠟封固每用一丸黃酒化服外敷亦用黃酒磨

塗此藥如在夏天修和取天落水拌之為丸

方歌 黎洞金瘡跌撲傷發背癰疽諸惡瘡癰癰刑傷瘋犬咬蜂

蛇蠍毒服敷良三七大黃冰麝魏兒茶天竹竭藤黃羊血

牛雄黃乳沒秋露和丸酒化強

桃花散 見發無定處血箭

如聖金刀散 見足部脫疽

生肌玉紅膏

陀僧膏

八珍湯

獨參湯

月白珍珠散 俱見潰瘍門

花蕊石散 見發無定處血瘰

箭頭入肉

附毒箭

箭頭入肉鉗不出解骨丸納羊脂敷煖銅毒箭金汁解射萬中人藍汁塗

註

箭頭嵌入肉內鉗不出者宜解骨丸納傷口內外用羊脂脂細嚼貼之覺癢忍之極癢箭頭漸冒撼動拔出卽以人尿洗之貼陀僧膏日換傷口自斂又有毒箭二種交廣者夷用焦銅作箭鏃甚毒人若中之纔傷皮肉便悶膿沸爛而死急飲金汁外亦用金汁抹之若金汁一時不得卽灌人糞汁並外敷之非此不能解毒也又一種以毒藥喂箭名爲射萬人若中之甚毒急用葛氏方用藍錠汁一盃灌

之外亦用塗抹傷處一法用大豆豬羊血內服外敷解毒
亦效又箭鏃不出者搗鼠肝塗之或鼠腦搗塗即出

解骨丸

蜣螂

研

雄黃

研

象牙末

各等分

共和勻煉蜜爲丸如黍米大納傷口處

方歌

解骨丸能拔箭鏃蜣螂雄黃功效速象牙末加蜜煉丸大

如黍米納傷處

陀僧膏

見瀆
湯門

鐵鍼入肉

鐵鍼入肉隨氣遊走向心胸險可愁烏鴉翎灰酒調服膏貼鍼出始免憂

註

凡鐵鍼誤入肉中無眼者不動有眼者隨氣遊走若走向心窩胸膛者險急用烏鴉翎數根炙焦黃色研細末酒調服一錢或二錢俱可外用神聖膏貼三五次其鍼自出前法用在一二日間效

神聖膏

用車脂輦油不拘多少研如膏調慈石末攤紙上如錢許貼之每日二換

鐵鍼誤入咽喉

誤吞鐵鍼入咽喉急飲蝦蟇血數頭鍼不即吐筴籬散或食餠糖出不留

註鐵鍼誤入咽喉無藥可施宜用癩蝦蟇數個將頭剝去倒垂流血以筴接之得一盃許灌入喉中移時連鍼吐出鍼自輒曲一方用舊筴籬煨存性研末每服三錢黃酒調服亦能化鍼或用飴糖一觔食盡便出

誤吞銅錢

誤吞銅錢雖無疼久留腹中病必成葶薺能化堅爲軟多食無傷可化銅

註

誤吞銅錢多食葶薺即能化堅爲軟若誤吞鐵骨等物腸中不能轉送覺墜者多食青菜豬脂自然送入大腸與葶同出甚效

骨𩚑咽喉

骨𩚑咽喉最可憂吐𩚑刺痛礙咽喉魚骨須用鴨涎灌獸骨狗

涎灌卽瘳

註

此證由𩚑物急迫骨𩚑於咽喉妨礙飲食吐𩚑刺痛宜急

治之然有魚骨獸骨之分誤吞魚骨者用河中養蓄活鴨
倒掛垂涎以磁盃接下令患人仰臥頻灌其骨盡化誤吞
獸骨者用狗一隻倒掛接涎如前法頻灌其骨盡化俱效
若失治咽喉腫痛潰膿宜用冰硼散吹之不可妄服涼藥
若骨勢大者與飲食難下餓倒胃氣者俱屬難救

冰硼散

見口部
驚口瘡

杖瘡

杖瘡須宜看其形已破未破要分明清涼拈痛膏破用敷之消腫並止疼未破瘀血須當砭湯劑急宜用大成玉紅膏貼瘀腐痛搽之新肉自然生

註

此瘡有已破未破之分已破者隨杖後用清涼拈痛膏敷之疼腫即消未破瘀血內攻者急宜砭去瘀血內服大成湯便通自愈如傷處瘀腐作疼者生肌玉紅膏搽之自然腐化新生其效甚捷

清涼拈痛膏

如意金黃散一兩加樟腦末三錢和勻又用生白石灰塊三

四觔許以水泡開水而石灰二三指露一宿將石灰面上浮
起油水結如雲片者輕輕帶水起入盥內有水一鍾對香油
一鍾竹筋攪百轉自成稠膏調前藥稀稠得所不用湯洗偏
敷傷處紙蓋布系夏月一日冬月二日方用葱湯淋洗乾淨
仍再敷之以腫消痛止爲度

方歌 清涼拈痛金黃散加入樟腦末三錢杖瘡破後多疼痛石

灰水油調敷痊

大成湯

見跌撲

生肌玉紅膏

見潰瘍門

如意金黃散

見腫瘍門

夾傷

夾傷禁用藥貼敷硃砂燒酒可調塗瓊液散服隨飲醉腫勢必消痛自除復受重刑潰破者代杖湯藥速宜調氣血弱者當大補六真膏貼痛卽無

註

夾傷卽擠傷也禁用敷藥膏藥及泥塗等法恐後必作腫成膿受刑初宜服代杖丹以護心隨用銀硃或硃砂末燒酒調敷傷處再著一人以手十指尖輕啄患者腳心此法癢次覺疼爲止次著一二人以筆管於患者腳面上輕輕趕之助通血脈候傷處凹者突起四圍腫大爲度卽服瓊液散隨飲至醉次日揩去所敷銀硃只用洗杖湯湯目燙

二三次次日再服瓊液散其腫自消痛即止矣如復受重刑以致破潰者外貼瓊液膏內服代杖湯繼宜大補氣血易於收功生肌時換貼六真膏其效甚捷

代杖丹

丁香

蘇木

蚯蚓

去土

無名異

丹皮

肉桂

木鱉子

乳香

沒藥

自然銅

各一兩
火煨醋淬七次

右爲末煉蜜和丸二錢重用一丸黃酒化下

方歌代杖護心血不攻丁香蘇木蚓無名丹皮肉桂木鱉子乳

香沒藥自然銅

瓊液散

開羊花

擇去梗蒂蕊葉洗去灰沙曬乾砂鍋微焙

為末每服五分壯者七分先飲醇酒至半酣次用調藥服

下再飲至大醉為度靜臥勿語語則發麻至次日其麻方

解消腫止疼其功甚捷連服三五次弱者間一日再服

方歌瓊液散消瘀血滯豫酌酒至半酣時開羊花末調服下瓊

漿復飲醉如癡

洗杖湯

陳皮

透骨草

南星

天門冬

地骨皮

天靈蓋 各五錢

象皮

一兩切碎

水煎浸洗日三二次

方歌

洗杖湯陳透骨星天冬地骨共天靈象皮水煎日勤洗夾

傷消腫又除疼

瓊液膏

當歸尾

鬧羊花

紅花

白芷

蒲黃 各二兩

香油一觔浸藥七日燥枯去渣入白蠟黃蠟各一兩溶化
盡絹濾淨稍溫再入莽片六分沒藥乳香末各六錢攪勻

和氣聖藥

攤貼

歌方 變液膏貼夾傷破歸開紅花芷蒲黃油燂又下白黃蠟再

加水片沒乳香

代杖湯

乳香

沒藥

蘇木 各二錢

蒲黃

木通

枳殼 麩炒

甘草

生

當歸尾

丹皮

木耳

穿山甲

各一錢 炙研

土木鱉

五個 焙

酒水煎服

歌方 代杖湯醫夾傷驢乳沒蒲黃通枳甘歸尾丹皮鱉木耳酒

煎蘇木炙穿山

六真膏

樟腦

三兩

孩兒茶

滴乳香

血竭

沒藥

三七

各三錢

共爲末用豬脂油十二兩盪盛水煮化將藥入油內和勻

攤貼

方歌

六真膏貼夾杖傷樟腦兒茶滴乳香竭沒三七脂油化和

敷諸瘡也相當

竹木刺入肉

諸刺入肉係外傷螻蛄搗塗最爲良如刺已出仍作痛再塗螻蛄卽無妨

註

諸刺入肉外傷之證也輕淺者以鍼撥出硬深者搗螻蛄塗之少時卽出如刺已出而仍作痛者再以螻蛄塗之卽愈

澀能醫小水利

瘋犬齧傷拔法

用砂燒酒壺兩個盛多半壺燒酒先以一壺上火令滾無聲
傾去酒卽按在破傷瘡口拔出汚黑血水滿則自落再以次
壺仍按瘡口輪流提拔以盡爲度其證立愈

玉真散

見破傷風

蠍螫 蠍螫

蠍螫急取大蝸牛搗爛塗之痛立休
蠍螫須將苧根搗取汁搽
塗患即瘳

註

凡蠍螫取大蝸牛一個搗爛塗之其痛立止一時不得蝸
牛即將螫處擠去毒水急用膏藥烤熱貼之亦能止痛
蠍者用苧根搗汁塗之即愈

蚯蚓傷

蚯蚓蔽傷受毒氣眉髻脫落全無跡法用鹽湯頻頻洗久則其毒自然去

註

蚯蚓蔽傷卽受蚯蚓之毒今人眉髻皆落狀如大麻風但夜則蚯蚓鳴於體中爲異耳宜用鹽湯頻頻洗之其毒自去

...

...

...

...

...

...

...

...

在... 卷之十一

甚疼痛嬰兒初生卽有者候過滿月熟透方可鍼之放出
赤豆汁或膿水汁其腫卽消初服五福化毒丹兼貼黃連
膏潰貼生肌玉紅膏生肌飲口若滿月後生者必待膿鼓
熟透鍼之若癰皮含血絲者詳註於紅絲癰

五福化毒丹

見赤游丹

黃連膏

見鼻部鼻疔

生肌玉紅膏

見潰瘍門

紅絲瘤

嬰兒初生紅絲瘤皮含血絲先天由精中紅絲腎伏火相傳患此終難瘳

註

此證一名胎瘤發無定處由小漸大嬰兒落草或一二歲之間患之瘤皮色紅中含血絲亦有自破者治法雖同胎瘤但此患由先天腎中伏火精有血絲以氣相傳生子故有此疾終變火證潰處亦難收斂

研勻香油拌如糊攤南青布上少半指厚捲成條線
再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用粗
碗接之布灰陸續剪去取所滴藥油浸冷水內一宿出火
毒抹用

方歌

烏雲膏搽胎瘕瘡油拌松香末硫黃布攤捲紫香油泡火

燃去灰用油良

潤肌膏

見頭部
白屑風

五福化毒丹

見赤遊
丹毒

葡萄疫

葡萄疫同葡萄狀感受厲疫鬱疑生福口發點青紫色毒攻牙齒類疳形

註此證多因嬰兒感受厲疫之氣鬱於皮膚凝結而成大小

青紫斑點色狀如葡萄發於遍身惟腿脛居多甚則邪毒攻胃以致牙齦腐爛臭味出血形類牙疳而青紫斑點其色反淡久則令人虛羸初起宜服羚羊角散久虛者宜服胃脾湯米泔水漱口以非疳散日擦四五次即效近見中年之人下虛者亦患此證治法同前

羚羊角散

胎驚丹毒

胎驚丹毒而初生形如水痘根微紅時出時隱延頸項繼發丹毒赤遊同

註

此證因孕母受驚傳襲子胎嬰兒初生之後週歲以上忽兩眼胞紅暈面色青黯煩熱夜啼或面如燕脂此屬伏熱在內散發於面狀如水痘根腳微紅時出時隱延及頸項繼發丹毒初用四聖散洗目其形色順逆治法皆同赤遊丹若此患延及胸乳痰喘抽搐此屬火毒攻裏防變驚風宜服百解散五和湯救之

四聖散

滯熱丹毒

滯熱丹毒亦遊形傷乳多食滯熱生較之赤遊走緩慢先宜消食次宜清

註

此證初發形若赤遊丹較之赤遊丹遊走緩慢因嬰兒乳食過多不能運化蘊熱於內達於肌表而生發熱面赤口酸舌有黃胎宜服保和丸先消食滯若唇焦便秘者宜一捻金服之丹毒仍作者宜犀角散服之其餘治法俱按赤遊丹

保和丸

白茯苓

半夏

製

山查肉

各五錢 各一兩

神麴 各一兩 炒

陳皮

蘿蔔子 炒

連翹 各五錢 去心

右研細末粥丸如梧桐子大每服三十九白滾水化下

方歌保和丸用茯苓夏陳皮蘿蔔子山查神麴連翹丸水服能

消乳積效堪嘉

一捻金

人參

大黃

黑丑

白丑

檳榔 各等分

共為細末每服一字蜜水調下

方歌一捻金醫食火積肩焦便秘服通利大黃黑白丑人參檳

嬰兒瘡瘍

嬰兒瘡瘍乳火成因食厚味滯火凝更兼六淫氣感受腫潰治

法按疽癰

註

凡嬰兒生瘡瘍小瘡多由乳母七情之火或過過歲能飲食者由過食乾焦厚味而生滯火更兼六淫之氣感受皆能成之但發表攻裏托裏消毒等法及腫潰外治俱按癰疽腫瘍潰瘍同嬰兒純陽火證居多非峻劑不能勝其病但肌體臟腑柔脆應效即止不可過劑

垂癰

嬰兒垂癰上腭生喉前結腫色紅疼積熱凝結宜刺破服五福丹抹水礪

註

此證生於喉前上腭下垂如珠紅腫脹痛不能吮乳三四日後宜用鍼刺一二分放出膿血其腫痛即減出積熱凝結而成宜服五福化毒丹兼用水礪散抹於癰處日三抹之乳母當忌魚腥辣物

五福化毒丹

見赤游丹毒

水礪散

見口部

胎風

臍疝

臍疝兒臍破水傷莖紙燒灰敷最良久而不愈風邪龍涎發風
爛緊繫防

註

此證由水濕傷臍所致若久不愈則發抽搐又因風邪外
襲也恐變風癰宜大草紙燒灰敷之或龍枯礬或再加龍
骨燒灰等分入麝香少許撒之即效

臍突

臍突胎中積熱由孕母失調停兒臍突出腫赤大宜清母
子即臍平

名醫集卷之十一

計

此證兒臍突出赤腫虛大是也由孕母失於調停兒在腹
胎受母積熱既生之後兒臍即腫宜清母子之熱兒臍不
必敷治恐反為害如何口外兒臍忽腫如吹不赤捻動微
响或驚悸作啼者宜用白芍藥湯加薏苡仁令兒服之外
以外消散敷之即愈

白芍藥湯

白芍

酒炒

澤瀉

五錢

甘草

生 錢二分

肉桂

揀薄者刮去粗皮一錢

共研粗末每用二錢水一鍾煎四分空心頻服

臍下痛加釣藤一錢生薑一片食鹽五釐

方歌白芍藥湯澤瀉廿再加肉桂共粗研專醫臍腫驚啼呌空

心煎服整二錢

外消散

大黃

牡蠣各五錢

朴消二錢

共研細末用活田螺數十枚洗淨再以清水半盆養之過宿取田螺清水調藥敷於患處其螺仍放水中勿害方效

方歌

外消散敷臍突胃大黃煨牡蠣朴消活田螺用清水泡過

宿取水將藥調

陰腫

陰腫之證小兒生久坐陰濕寒氣凝或因怒叫氣結閉寒熱虛實擇可行

註

此證即古名脫囊山久坐陰濕之地為寒氣所凝而成間或有因怒叫氣閉結聚於下而成者俱宜用桃仁丸主之若寒氣客於厥陰少陰者則陰囊腫痛腹痛冷汗引縮二子入腹痛止方出謂之內引宜烏梅散勻氣散主之有陰莖全縮不見或不縮而陰囊腫大光亮不燥不疼者肝腎氣虛也宜橘核煎湯調勻氣散服之囊腫及四肢俱腫二便不利者膀胱蘊熱風熱相乘也宜白牽牛散主之若女

兒陰戶腫脹者心熱相傳也宜導赤湯服之或五苓散用

薏苡車前子煎湯調服外治法俱敷立消散甚效

桃仁丸

桃仁七錢五分
去皮尖炒微黃

白蒺藜微炒去刺

桂心
丹皮各五錢

黑牽牛二錢五分
頭末

白為細末煉蜜和丸如黍粒大每服十九黃酒送下

方歌桃仁丸逐陰腫疾怒氣閉結或濕蘘蒺藜牽牛桂丹皮研

末蜜丸如黍粒

烏梅散

烏梅肉

甘草半生半炙

元胡索各五錢

釣藤鈎

乳香

沒藥 各二錢五分

共搗粗末每服二錢水一鍾煎七分服

方烏梅散用乳香沒釣藤甘草元胡索陰囊腫兼腹中疼煎

服必先研粗末

勻氣散

桔梗 二兩 炒

陳皮 一兩 去白

茴香 炒

縮砂仁 各五錢 炒

甘草 四錢 炙

薑炭 二錢五分

共研細末每服五分或一錢白滾水調下

方勻氣散因外寒侵陰囊痛汗淋淋枯梗陳皮甘草炙煎

香薑炭縮砂仁

卷之十一

方五苓白朮桂心加赤茯苓除心火邪猪苓澤瀉能分利調和臟腑效堪誇

立消散

赤小豆

風化消

赤芍

枳殼

商陸各五錢俱不宜見火曬乾共研為末

用枳拍葉煎湯候冷調敷腫處

方歌立消除腫痛注因受風寒濕熱毒赤小豆與風化消芍

枳同研加商陸

導赤湯

見口部

脫肛

小兒脫肛肺虛源補中益氣湯若先腫硬作痛除積熱臍毒翻肛臍連丸

註

此證由小兒氣虛肛脫於外用補中益氣湯加羌活白芍煨薑主之如腫硬疼痛者有濕熱在內當用清熱除濕之劑以清之若生臍毒肛門翻出者以臍連丸為主外治以五倍子老葱頭朴消煎湯洗之腫用坎宮錠子塗之俱效

補中益氣湯

見費場門

臍連丸

見醫部痔瘡門

坎宮錠子

見腫瘍門

肛門作痒

肛門作痒係蟲傷下唇必生小白瘡九味蘆薈丸與服外撒銅綠共雄黃

註

此證係小兒肛門作痒由蟲蝕也視其下唇內必生小白瘡或耳之前後結小核如串珠者是也書曰下唇有瘡蟲蝕其肛宜用蘆薈丸服之外用雄黃銅綠等分爲末撒之

卽效

蘆薈丸

見齒部
牙齦

遺毒

遺毒稟受結胎先無皮身赤未易痊肌膚紅點次斑爛染受尚

可稟毒難

註此證係先天遺毒於胞胎有稟受染受之分稟受者由父

母先患楊梅而後結胎元嬰兒生後則周身色赤無皮毒

攻九竅以致爛斑患此難愈百無一生染受者乃先結胎

元父母後患楊梅毒氣傳於胎中嬰兒既生則頭上坑凹

肌膚先出紅點次發爛斑甚者毒攻口角眼眶耳鼻及前

陰穀道破爛初宜入中黃細末三五分土茯苓煎湯調稠

日用二三服腫用太乙紫金錠水磨塗之破爛者用黃蘗

蜜炙為末撒之乾用香油調搽按藥應效者後服二黃散
十中可保三四若毒延徧身日夜多啼不喫乳食者屬毒
甚氣微終難救治

二黃散

胡黃連

山慈菇 各二錢

甘草 一錢五分
生

牛黃 七分

右為細末每服三分蜜湯調服

方歌 二黃散治遺毒方胡連甘草共牛黃山慈菇研為細末每

服三分加蜜湯

太乙紫金錠 見胸中脾發疽

痘裏夾癰

痘裏夾癰生頸項形如桃李瓜棗狀證兼身熱多渴煩痰氣凝結致此恙

註

此證結於頸項或生耳後腋下形如桃李瓜身熱煩渴由痰氣凝結所致痘初起卽發癰者治宜托裏消痰解毒如木通桔梗生地甘草蟬蛻芍藥荆芥等藥缺一不可若芩連等藥及耗燥之劑俱不可用若痘發在三四日而作癰者則毒隨痘洩毒隨痘灌自可挽全而無害宜服三消散倘斯時紅腫將膿一潰則元氣洩而痘漿必不能充灌乘未潰時急用黃耆衛元湯補之若痘至七八日灌漿時

而發癰者冲和飲子主之若痘瘡蒼蠟色而作癰者宜消
毒兼保元氣潰後宜生肌玉紅膏貼之

三消散

當歸

赤芍

天花粉

甘草

牛蒡子

炒研

白茯苓

生地黄

紅花

蟬蛻
去足翅

木通

半夏
各八分
製

水二鍾燈心二十根煎六分服

三消痘發三四日痰涎結癰須當治歸芍天花甘草生

地紅蟬通夏製

黃耆衛元湯

黃耆

人參

當歸

桔梗

紅花

甘草
炙

白芍

酒炒

防風 各一錢

水煎不拘時服

方歌黃耆衛元癭腫起已潰未潰急補之木參歸結紅花草防

風芍藥服無時

冲和飲子

麥門冬

去心

人參

桔梗

當歸

黃耆

柴胡

雜錄醫方金鑑卷七十一

白芍

酒炒

白茯苓

天花粉

荆芥

防風

連翹

去心

白朮

各七分
土炒

水煎服

方歌

中和飲子麥門冬參桔歸蒼柴芍苓花粉荆防翹白朮

發七天痰氣凝

生肌玉紅膏

見費
傷門

痘疔

痘疔不與痘瘡同俗呼賊痘是其名色紫黯黑硬如石諸證蜂起難灌膿疔有多般須宜記再審何處發其形捲簾疔生舌根底大小不一最易明火珠疔生鼻孔內闌塞噴火面赤紅眼沿生疔名忘汲腫如封蛤熱煩增豢虎疔於耳內見腎毒攻耳致成形燕窩疔生兩腋下面赤譫語更腫疼注命疔生足心裏紫筋直透足股中透腸疔在肛內發痛如錐刺一般同驪龍疔生尿孔內身熱譫語便不通法按疔名施醫治自然諸證悉能平

註

此證名多治不一法痘生五六日間或三五枚或六七枚

雜於諸痘之間其色紫黯甚則黑硬如石有此以致諸證

蜂起不能灌膿如捲簾疔生於舌根底小如黑豆大似菊
菊令兒舌捲喉痛急用銀鈎鈎破儘淨惡血隨以苦茶漱
口搽拔疔散再以冰片礪砂青黛黃連薄荷荊芥炒薑
共爲細末吹用火珠疔生於鼻孔內關塞噴火而赤眼紅
亦用銀鈎鈎破用黃連膏加水片滴入鼻孔內服瀉金散
忌食疔生於眼沿腫如封蛤煩熱面紫宜挑破用熱脂嚼
汁點之兼蒲公英菊花煎湯洗之參虎疔生於耳內於膿
成之時宜挑破搽拔疔散燕窩疔生於腋下腫硬面赤譫
語如疔在左腋潛注則右體之症沉伏失色右亦如之亦
挑破去其根用拔疔散搽之服消毒飲子注命疔生兩足

心腫硬如錢如豆如椒有紫筋直透足腹挑之去淨血用
田螺水點之次用愼火草菜豆浸脹搗爛敷之透腸片生
肛門旁在六七朝腫硬如錐挑之銀花防風煎湯令洗之
次用輕粉珍珠水片白斂末塗之內服黃連解毒湯曬能
疔生尿孔內於五六朝身熱譫語服翻股厥腹脹小水閉
瀉急用蟾酥牛黃水片磨香研末次用黃連細茶濃煎候
冷取半匙調末以細軟稻心蘸之送入孔內服消毒飲子
甚效

瀉金散

犀角

鎊

牛蒡子

炒研

紅花

雜考醫方卷之十一

生地

桔梗

赤芍

紫蘇

甘草 各一錢

水煎服

方歌 瀉金散治火毒疔面 赤眼紅鼻內疼犀旁紅花生地桔赤

芍紫蘇甘草生

消毒飲子

白茯苓

生地

連翹 去心

牛蒡子

炒研

紅花

甘草 生

犀角

鎊

木通

赤芍 各一錢

燈心二十根水煎服

方歌 消毒飲子 苓生地 翹茅紅花 甘草犀木通 芍藥燈心 共善

却疔毒火證宜

拔毒散

見牙齒部牙疔

黃連膏

見鼻部鼻瘡

田螺水

見腎部

黃連解毒湯

見牙部黑疔

痘裏發丹

痘裏發丹因熱極宜施涼血散毒劑塗抹內服量寒涼外用化

斑湯洗浴

註

此證由內熱甚極而成內宜服生地牛蒡芍藥甘草木通

荊穗等藥其毒白消腫痛者加柴胡羌活頭頂盛者毒湊

上焦也宜用炒黃連柴胡甘草車前子梔子等藥外用化

斑解毒湯洗浴量服寒涼藥及豬膽京墨水片塗抹丹之

形色與赤遊丹毒參考

化斑解毒湯

見助部內發丹毒

痘爛

痘爛浸淫無完膚水淬茶葉帶濕鋪上隔草紙令兒臥一夜膿乾爛卽除

註

此證係出痘破爛身無完膚膿水浸淫沾黏衣服宜川茶葉揀去梗入滾水一燂卽撈起再揀去梗濕鋪牀上上隔草紙令兒臥之一夜膿乾甚效

痘風瘡

痘風瘡生先作癢次延成片水浸淫痘後遇風甚成癩麥錢散搽效可申

名醫集卷之十一

註

此證由痘後遇風所致先發細瘡作癢次延成片脂水漸長浸淫宜滲濕救苦散搽之兼避風戒口甚者搽癢毒水浸淫肌無完膚即成痘癰急用十全大補湯大補氣血兼散風苦參丸以清熱解毒二方合而服之外塗麥錢散甚效

滲濕救苦散

蜜陀僧

滑石 各二兩

白芷 五錢

右研細末乾用白蜜調搽濕則乾撒

歌方 滲濕救苦散白芷蜜陀僧研入滑石痘風瘡起癢成片白

蜜調搽可去之

麥散

小麥

一合炒焦存性

硫黃

四錢

白砒

一錢

共研細又加烟膠末八錢枯礬末川椒末各三錢共和勻
先以葱湯洗淨患處香油調塗油紙蓋紫三日一換

此散痘風成癩惡小麥炒加砒硫黃次入烟膠枯礬末川

散香油調上良

十全大補湯

見清湯門

散風苦參丸

見發無定處癬

逐日人神所在不宜鍼灸歌

人神走注須當記足大指兮屬初一外踝二日股內三四日在
腰五口寄六手七日內踝存八腕九尻腰背十十有一日鼻柱
間十二口兮在髮際十三注於牙齒中十四常在胃腕聚偏身
十五十六胸十有七日氣衝集十八股內足十九二十日在內
踝麗二十一曰手小指念二外踝神所寓肝及足兮二十三在
手陽明念四日二十五口足陽明念六在胸念七膝二十八日
伏於陰念九卽在膝脛室三十日兮在足趺人神所在刺灸忌
十二時人神歌

子課丑腹實在目卯而辰頭已午胸未腹申在心酉背戌

頭亥股續

十二支口人神所在歌


子不治頭君須認丑口腰耳寅咽喉卯口鼻脾辰膝腰巳手午
心真捷徑未頭手足申頭背酉行膝背同其類戌口在陰頭面
間亥日遊行頭頸位十二支神禁灸歌男除女破應該會

十干日不宜用鍼犯之病多反覆

甲不治頭乙耳喉丙肩丁背與心求戊巳腹脾庚腰肺辛膝壬
當腎脛收癸日不宜鍼手足十干不犯則無憂

不... 卷七十一

屍神圖



此神農所置一歲起坤
 二歲震逐年順飛九宮
 週而復始行年到處則
 所主故切忌鍼灸慎勿
 犯之否則變生他病慎

